

葫芦岛完善“两病”保障政策 全面取消“两病”门诊用药保障起付标准

省中西医结合医院 治未病科心理门诊开诊

本报讯 记者姜晓菲报道 儿童青少年阶段由于心理及生理各方面变化较快,受家庭及生活、学习环境的影响,很容易导致心理问题或心理疾病。近日,辽宁中医药大学附属第四医院(辽宁省中西医结合医院)治未病科心理门诊开诊。

辽宁中医药大学附属第四医院治未病科、儿科主任,副主任中医师刘玉凤介绍,情绪问题主要表现为焦虑、抑郁、自卑等;行为问题包括叛逆、攻击、自伤等;学习问题则主要体现在厌学、注意力不集中等;人际交往问题则主要表现为社交困难、人际冲突等。这些问题往往多源于教育高压、家庭不和谐、缺乏沟通、网络成瘾等原因。

近几年,青少年心理健康问题受到家长和社会的广泛重视。医院治未病科心理门诊的开设主要针对处于青春期的孩子们的情绪问题、行为问题以及学习问题和人际交往问题等进行心理疏导、解答与诊治。

沈阳市中医院义诊活动进乡村 专家共接诊 农村居民137人次



专家为居民进行义诊。
沈阳市中医院供图

本报讯 记者勾思涵报道 6月13日,沈阳市中医院联合沈阳市发展改革委机关党委、沈阳市发展改革促进中心党支部,赴康平县胜利街道孔家村和小城子镇曹家窝堡村,开展了“中医进乡村、健康助振兴”党建联合义诊、巡诊和健康讲座活动。

此次义诊,沈阳市中医院党委书记周强带领沈阳市中医院8名省市著名中医专家深入乡村基层,对行动不便的患者上门巡诊。义诊专家在现场开展常规医疗问询和体格检查,对部分患者进行滞动针治疗。专家们还结合农村居民的实际,进行了健康宣教,包括中医药知识的普及、健康生活方式的培养、如何养病防病等。此外,医院还免费为居民提供了血压、血糖检测,并根据检查结果给出了相应的健康建议。

通过中医专家的现场诊疗、健康宣教以及中医药文化的传播,为农村居民提供便捷、高效的医疗服务,同时增强居民的健康意识和自我保健能力。本次义诊活动共接诊农村居民137人次。

药保障,将未纳入门诊特慢病保障范围的“两病”患者,纳入“两病”门诊用药保障范围。优化门诊慢特病认定流程,考虑到透析患者一般都并发其他基础疾病,开通慢特病透析患者“绿色通道”,由医疗机构协助患者申请认定相应病种,可组织专家根据患者完整的申请材料直接进行认定,不需体检复查,同时不区分病种待遇类型,认定后均可即时享受待遇,来开具糖尿病、高血压等疾病用药。

与此同时,葫芦岛市优化了支付管理。将“两病”门诊用药纳入医保支付范

围,根据省级规定实施药品价格管理,按照标准流程进行医保支付,确保患者及时获得所需药品和医保基金安全运行。截至目前,葫芦岛市“两病”门诊覆盖患者累计19.2万人,当年享受待遇2500多人次、统筹基金支出35.28万元。

据悉,葫芦岛市将217家定点医疗机构纳入“两病”门诊用药医疗机构范围,其中乡镇基层卫生院111家,实现基层医疗机构街道、乡镇、村屯全覆盖,极大提升了基层医疗服务的可及性和便利性。

普及健康知识 提高健康素养

沈阳市卫生健康服务中心健康讲座进乡村

本报讯 记者姜晓菲报道 近日,沈阳市卫生健康服务中心健康科普讲座进村屯活动走进康平县方家乡镇西街村。本次活动向居民和村医发放《高血压健康教育知识手册》100本,发放“做自己健康第一责任人”防晒草帽66个。

高血压是我国常见的心血管疾病之一,而我们在日常工作中发现,有居民在高血压的自我健康管理、用药等方面不同程度存在不科学行为方式或者认识误区。为解决这些问题,本次活动围绕“高血压”开讲,旨在宣传普及高血压健康知识,提高居民高血压健康素养能力。

活动由沈阳市卫生健康服务中心曹丹主持,同时以“做自己健康第一责任人”为题,向居民传递和倡导要关注身体健康,学习健康知识,提升健康素养,做好自我健康管理的理念。受邀专家、沈阳市第六人民医院内二科主任陈用贵结合临床案例和生活中常见问题,用通俗易懂的语言,与居民亲切交流,传授高血压的风险因素、对健康的危害、如何科学



专家为村民讲授健康科普知识。

沈阳市卫生健康服务中心供图

服用降压药和如何测量血压等知识,为居民答疑解惑。

健康科普讲座后,曹丹建议村医结合日常健康教育工作,将所听所学传授

给各自村的居民,扩大受益人数和覆盖面,让更多的居民掌握科学知识和技能来正确管理自身的健康,为守护辖区居民的健康贡献力量!

女子饮酒后意识模糊 沈阳急救中心成功救治

专家提醒:急性酒精中毒或有脑血管病风险

本报讯 记者单强报道 沈阳急救中心大东二分中心的薛鹏急救小组接到紧急指令,迅速赶赴大东区某小区,为一名中年女子提供急救服务。据悉,该女子在家中饮用高度白酒约300毫升后,出现意识模糊、躁动及呕吐症状。

到达现场后,薛鹏医生通过仔细询问得知患者饮酒情况,并观察到其有明显的酒精中毒症状。然而,基于丰富的临床经验,薛鹏医生意识到患者的症状可能不仅是由酒精中毒引起,也可能隐藏着更为严重的急性脑血管病风险。

医护人员迅速为患者进行了初步检

查,并启动了一系列急救措施,包括稳定生命体征、清理呕吐物、保持呼吸道通畅等。同时,为确保患者得到及时有效的治疗,急救小组决定将患者迅速转运至附近医院进行进一步诊断和治疗。

在转运过程中,薛鹏医生再次强调了对急性酒精中毒患者可能存在急性脑血管病风险的重视。他指出,酒精对神经系统有显著的影响,可能导致大脑功能异常,出现类似脑血管病的症状。同时,长期过量饮酒也是脑血管病的重要危险因素之一。

因此,在面对急性酒精中毒患者时,

急救人员需要保持高度警觉,不仅要处理酒精中毒本身的症状,还要密切观察患者的后续病情变化。一旦出现意识障碍加重、剧烈头痛、喷射性呕吐等不寻常表现时,应立即怀疑急性脑血管病的可能性,并尽快送往医院进行全面检查和评估。

此次成功救治提醒我们,在面对患者饮酒过量导致的急性酒精中毒时,必须时刻保持警觉,充分认识到可能存在的潜在风险。同时,提高公众对急性酒精中毒及其可能并发症的认识和了解,共同维护自身和他人的健康与安全。